



Vídeo de formação do projeto OPT-SMC

Administração porta a porta da **Quimioprevenção do Paludismo Sazonal (QPS)**

| | |
|---|---|
| | |
| 1 | Depois de visualizar este vídeo, saberá melhor como se desenrola a campanha anual de QPS, bem como o que deverá fazer para proteger as crianças contra o paludismo durante a estação das chuvas. |
| 2 | Assim que chegar a uma casa explique que você e o seu colega foram enviados pelo distrito para administrar um tratamento importante que protegerá as crianças contra o paludismo. |
| 3 | Este ano, devido à COVID-19, todos os agentes de saúde devem utilizar máscara e manter o distanciamento físico de todos os membros do agregado familiar. |
| 4 | Garanta que mantém um distanciamento físico em relação à responsável pelas crianças e às próprias crianças. |
| 5 | Lave suas mãos. |
| 6 | Pode começar Encontre um local para se sentar e solicite à responsável pelas crianças que traga uma colher e água potável. |
| 7 | Prepare o material necessário: Estes incluem: <ul style="list-style-type: none"> ✓ O blíster de comprimidos de QPS ✓ O cartão da QPS ✓ O registo ou boletim ✓ A ficha de contabilização ✓ A caneta |

| | |
|----|---|
| 8 | <p>Se se tratar da primeira visita do ano, deve registar as informações de TODAS as crianças com menos de 5 anos no registo de QPS. Por isso, peça para ver essas crianças.</p> <p>Se a criança tiver menos de 3 meses, NÃO deverá receber o tratamento da QPS nessa visita, mas poderá recebê-lo mais tarde nesse ano. Certifique-se de que a inclui no registo.</p> <p>Desse modo, garantirá que nenhuma criança ficará sem tratamento nas suas próximas visitas.</p> |
| 9 | Deverá igualmente preencher um cartão da QPS para cada criança elegível. |
| 10 | <p>Escreva o nome da criança e os seus dados pessoais</p> <p>Apenas deve completar o registo da QPS APÓS ter administrado o medicamento da QPS à criança.</p> |
| 11 | Antes de começar, deve determinar se a criança é elegível para receber o tratamento da QPS. |
| 12 | <p>Em primeiro lugar, deve determinar a idade da criança.</p> <p>Se o responsável pela criança não a souber, peça para ver o cartão de vacinas da criança ou pergunte a outro membro da família.</p> |
| 13 | Se a criança não se sentir bem, não poderá receber o medicamento da QPS e deverá ser levada ao centro de saúde ou a um agente de saúde comunitária para ser observada. |
| 14 | Se a criança tiver um teste positivo para o paludismo, deve receber o tratamento de ACT. |
| 15 | Se a criança tiver apresentado efeitos secundários graves devido aos medicamentos de QPS ou a outros medicamentos, no passado, não deve receber medicamentos de QPS. |
| 16 | Pergunte se a criança tomou outros medicamentos nas últimas 4 semanas. |
| 17 | Se tiver tomado SP ou AQ (para o paludismo) ou Bactrim/Cotrimoxazol (para uma infeção), a criança não deve receber o medicamento de QPS desse dia. |
| 18 | Quando tiver a certeza de que a criança é elegível, poderá prosseguir à administração do medicamento. |
| 19 | Selecione o blíster adequado à idade da criança. |

| | |
|----|--|
| 20 | pouse o blíster numa superfície ou mesa. |
| 21 | Explique à responsável pela criança que deverá administrar os DOIS primeiros comprimidos, à criança |
| 22 | Peça à responsável pela criança que acrescente lentamente uma pequena quantidade de água até cobrir os comprimidos e que misture lentamente. |
| 23 | <p>Certifique-se de que a criança está bem acordada e sentada direita. Garanta que a criança não tem a cabeça demasiado inclinada para trás.</p> <p>Peça à responsável que dê lentamente o tratamento à criança, garantindo que esta engole todo o conteúdo da colher.</p> <p>Aguarde alguns minutos para se certificar de que a criança fica bem.</p> |
| 24 | <p>Informe a responsável de que, se a criança vomitar TODO o tratamento nos 30 minutos seguintes, deverá ser administrada uma nova dose de tratamento.</p> <p>Ela deverá ir ao seu encontro e pedir-lhe que regresse para lhe dar um novo blíster. Não se esqueça de recuperar o blíster antigo.</p> <p>Se a criança vomitar novamente, aponte o ocorrido no registo. Não lhe dê um novo tratamento.</p> |
| 25 | <p>Após ter concluído o preenchimento do cartão de QPS, coloque-o ao alcance da responsável pela criança e recue. O cartão QPS é um lembrete para o cuidador e um registo dos tratamentos de seu filho.</p> <p>Preencha a ficha de contabilização indicando o número de crianças que receberam o tratamento durante a visita.</p> |
| 26 | Explique que o tratamento completo deve ser tomado durante TRÊS dias e que a criança deve tomar UM comprimido no dia seguinte e UM comprimido no dia a seguir a esse |
| 27 | <p>Agradeça à família por ter participado na campanha e recorde as mensagens principais</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Lembre-se da data da próxima visita ✓ Guardar o tratamento num local seco e fora do alcance das crianças ✓ Terminar o blíster ✗ Não dar o medicamento a nenhuma outra pessoa |

| | |
|----|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Os medicamentos da QPS são seguros e bem tolerados. Os efeitos secundários graves são raros. No entanto, se a criança adoecer após ter tomado os medicamentos da QPS, deve ser levada ao centro de saúde. ✓ O tratamento da QPS dá uma proteção de 1 mês. ✓ A QPS é essencial por um período de 3, 4 ou 5 meses, dependendo da duração da estação das chuvas. ✓ Todos os membros do agregado familiar devem dormir sob uma rede mosquiteira impregnada de longa duração de ação (MILDA). ✓ Peça à responsável pela criança que lave as mãos depois de saírem da casa. |
| 28 | <p>Obrigado por ter assistido a este vídeo.</p> <p>Agora, é capaz de administrar a QPS com toda a segurança, dando uma proteção vital contra o paludismo às crianças.</p> |