Niger: CPS 2023

Vidéo de formation du projet OPT-SMC

Administration de la Chimioprévention du Paludisme Saisonnier en porte à porte (5 ou 10 ans)

	Script
1	Après avoir visionné cette vidéo, vous apprendrez mieux comment se déroule la campagne annuelle de CPS et ce que vous devriez faire pour protéger les enfants contre le paludisme pendant la saison des pluies
2	Cette année, du fait de la COVID19, tous les agents de santé doivent porter un masque et garder une distanciation physique avec tous les membres du ménage.
3	Dès que vous arrivez dans la concession Saluez les membres du ménage. Respecter les coutumes et les us Expliquez que vous et votre collègue êtes mandatés par le centre de santé, vous êtes venus pour dispenser un traitement important qui protégera les enfants contre le paludisme.
4	Assurez-vous de garder une distanciation physique par rapport à la gardienne de l'enfant et aux enfants
5	Lavez vous les mains avec de l'eau et du savon ou utilisez du gel hydroalcoolique
6	Vous pouvez à présent commencer Demander une place pour vous asseoir Demandez à la gardienne d'enfant d'apporter une tasse, une cuillère, de l'eau potable
7	Sortez vos outils pour la procédure. Cela comprend: ✓ La plaquette de comprimés CPS ✓ La carte CPS

	✓ La feuille de pointage ✓ Le MUAC Si vous enregistrez le traitement de la CPS électroniquement, vous devrez ouvrir l'application sur votre téléphone ou tablette Android
8	Demandez à voir tous ces enfants Selon le district dans lequel vous travaillez, il s'agira soit de tous les enfants de moins de 5 ans, soit de tous les enfants de moins de 10 ans Si un enfant a moins de 3 mois, il ne recevra PAS le médicament de la CPS lors de cette visite, mais il pourra le recevoir plus tard dans l'année.
9	Vous devez remplir également une carte CPS pour chaque enfant éligible.
10	Reportez le nom, prénom et les données personnelles de l'enfant. Vous n'administrez le traitement CPS qu'APRES avoir enregistrez l'enfant sur la carte CPS
11	Avant de commencer vous devriez déterminer si l'enfant est éligible à recevoir le traitement de la CPS
12	Premièrement, vous devez déterminer l'âge de l'enfant Si la gardienne de l'enfant doute, demandez à voir le carnet de vaccination de l'enfant ou demandez à un autre membre de la famille de vous renseigner
13	Si l'enfant ne se sent pas bien, il ne peut pas recevoir le médicament CPS, il doit être conduit au centre de santé ou à un agent de santé local afin d'être examiné.
14	Si l'enfant a un test positif pour le paludisme, il doit recevoir un traitement contre le paludisme
15	Si dans le passé l'enfant a eu des effets secondaires sévères dus aux médicaments CPS ou à d'autres médicaments, il ne doit pas recevoir de médicaments CPS.
16	Demandez si l'enfant a pris d'autres médicaments au cours des 4 dernières semaines.
17	Si l'enfant a pris de la SP ou de l'AQ (pour le paludisme) ou du Bactrim /Cotrimoxazole (pour une infection), il ne devrait pas recevoir le médicament CPS de ce jour

18	Quand vous serez sûr de l'éligibilité de l'enfant, vous pourrez poursuivre la procédure d'administration
19	Sélectionnez la ou les plaquette (es) appropriée par rapport à l'âge de l'enfant
20	Posez la plaquette sur un support
21	Expliquez à la gardienne d'enfant, qu'elle va donner les DEUX premiers comprimés à l'enfant de moins de 5 ans Pour la premiere prise c'est un comprimé jaune et un comprimé blanc Si vous intervenez dans une zone ou région dans laquelle la CPS est administrée aux enfants de 5 à 9 ans, la gardienne doit donner quatre comprimés si l'enfant est agé de 5 à 9 ans. Il recevra deux blisters, une de 3-11 mois et une de 12-59 mois Pour la première prise c'est deux comprimés jaunes et deux comprimés blancs
22	Demandez à la gardienne d'enfant d'ajouter lentement une petite quantité d'eau couvrant les comprimés, et de remuer le mélange.
23	Pour les jeunes enfants, assurez-vous que l'enfant est bien éveillé et assis en position droite. Veillez à ce que la tête ne soit pas trop penchée vers l'arrière. Demandez à la gardienne de donner lentement le traitement à l'enfant en s'assurant que tout le contenu du verre a été avalé. Demandez à la gardienne de verser un peu d'eau dans le verre et de donner le contenu à l'enfant en s'assurant que le verre est maintenant vide Au cas où l'enfant est capable d'avaler les comprimés de lui même, donnez lui un verre d'eau et les comprimés pour qu'il le fasse. Patientez quelques minutes pour s'assurer que tout va bien pour l'enfant
24	Dites à la gardienne d'enfant, si l'enfant vomit tout le traitement dans les 30 minutes qui suivent, une deuxième dose de traitement doit lui être remise. Elle doit vous chercher et vous demander de revenir afin que vous lui remettiez une nouvelle plaquette.

	N'oubliez pas de récupérer l'ancienne plaquette pour la remettre à votre superviseur. Si l'enfant vomit à nouveau, rassurer la maman qu'il recevra la même chose au prochain passage notez l'événement dans le registre ou sur la tablette ou téléphone android. Ne pas lui remettre un nouveau traitement
25	Après avoir complété le remplissage de la carte CPS, placez-la là où la gardienne d'enfant peut la prendre. La carte CPS est un aide mémoire pour la gardienne de l'enfant mais aussi sert à enregistrement le traitement reçu par l'enfant . Complétez la feuille de pointage en indiquant le nombre d'enfants ayant reçu le traitement au cours de la visite.
26	Expliquez que le traitement complet doit être pris pendant TROIS jours et que l'enfant de moins de 5 ans doit prendre UN comprimé le lendemain et UN comprimé le surlendemain. Dans les zones ou régions où la CPS est administrée jusqu'aux moins de 10 ans, l'enfant qui est âgé de 5 à 10 ans devra prendre deux comprimés le lendemain et deux comprimés le surlendemain Demander aussi à la mère de cocher sur la carte CPS les deux doses administrées à domicile
27	Remerciez la famille d'avoir pris part à la présente campagne et leur rappelez les messages clés ✓ Cocher sur la carte la deuxième et trosieme dose ✓ Rappeler la date de la prochaine visite ✓ Rappellez à la gardienne de l'enfant de bien garder la carte CPS de l'enfant ✓ Gardez le traitement dans un endroit sec et hors de portée des enfants ✓ Terminer la plaquette **X** Ne donnez ce médicament à personne d'autre ✓ Les médicaments de la CPS sont sûrs et sont bien tolérés. Les effets secondaires graves sont rares. Mais si l'enfant tombe malade après avoir pris les médicaments CPS, amenez-le au centre de santé. ✓ Le traitement CPS protège pour 1 mois. La CPS est essentielle pour une période de 3, 4 ou 5 mois selon la durée de la saison des pluies

	✓ Chaque membre du ménage doit dormir toutes les nuits et toute l'année sous une moustiquaire imprégnée à longue durée d'action. ✓ Utilisez le bracelet pour mesurer le périmètre brachial afin de détecter les enfants malnutris. En cas de dépistage d'un malnutris aigue sévère, veuillez le référer au centre de santé pour une meilleure prise en charge. ✓ Demandez à la gardienne de l'enfant de se laver les mains dès que vous aurez quitté la demeure
28	Merci d'avoir regardé (suivi) cette vidéo. Vous êtes désormais capable d'administrer en toute sécurité la CPS pour une protection vitale des enfants contre le paludisme.